

越峰在前兩期《峰訊》中分別探討了「冰毒與懷孕」及「冰毒與性」這兩個主題,今期《峰訊》將集中探討「冰毒與社會隔離」。從中了解冰毒對吸毒者的個人行為、社交及生活等方面的影響。同時,亦透視冰毒讓人沉迷的背後原因。

冰毒是一成癮性極高的毒品。當吸食冰毒時,大腦會釋放多巴胺,傳遞興奮和開心的信號。這種由興奮劑帶來的愉悦感會在大腦中留下深刻的記憶,不斷的吸食過程會不停地強化這種記憶,因而令吸毒者產生強大的心癮並且持續依賴冰毒。對吸食冰毒者而言,正常社交娛樂所獲得的愉悦感遠低於冰毒引發的快感,故此他們只有透過繼續吸食冰毒,才能獲得快樂的感覺。

另一方面,吸毒者會因沒有持續吸食冰毒而出現斷癮症狀,包括:沒精打采、坐立不安、脾氣暴躁,甚至出現行為失常和抑鬱等問題, 導致吸毒者只懂沉迷冰毒,大大影響他們的自身、社交及生活。

不自覺的社會隔離

「係我選擇唔同朋友食飯,好多時候其實約好左,明明換好衫、準備好出門口,到最後都係無出。有幾次試過出左門口,行到去巴士站準備搭車但最後覺得好麻煩,唔想去,都係行返返屋企。」 Hayden(化名)表示未吸食冰毒前,他很熱愛和朋友相聚,但吸食冰毒後,只想獨個兒躲在家,沉溺在「冰海」之中。事實上,冰毒會影響人對事物的興趣,很多長期吸食冰毒的人,他們對身邊的事與物均失去興趣,疏離正常的社交生活,不自覺地漸漸將自己隔離。另外,吸食冰毒者口腔衛生很差,臉上和身體其他部份的皮膚會長出「冰瘡」,亦令他們抗拒社交。

很多時吸毒者不會察覺自己的轉變,只認為是別人的問題。





自我選擇的隔離

「當時既情況,就好似足球員入波後,衝向觀眾give me five咁,好多手伸出黎,但就拍拍手就算。」Hayden形容吸食冰毒的高峰期,一直都有不同的人向他伸出援手,如:家人、社工及朋友等,但當時他選擇不抓緊這些機會而選擇收藏自己。

「覺得自己攪得掂,唔想被人煩到。」根據青山醫院精神健康學院資料顯示,每五個冰毒成癮者便有一個出現幻覺、妄想、失眠、行為失常等症狀,令他們情緒變得負面,妄想受到迫害,害怕與人接觸。



有些人因孤獨而選擇吸食毒品,有 些人因吸食毒品而變得更孤獨。

處理孤獨感是戒毒康復治療中重要的一步。吸毒人士或許會將毒品當成其重要的朋友,認為是毒品陪伴他們渡過黑暗、寂寞的時光。當他們選擇踏出戒毒的一步時,他們或許會因要離開「毒品」這個「朋友」而感到十分不安、痛苦或憤怒。身邊人明白及接納他們的感受,鼓勵及協助他們建立自信、正面的社交支援網絡及健康生活模式,有助他們打破因孤獨和吸毒引起的惡性循環。

路是人走出來的, 千里之遙的路, 必須從第一步開始。



證嚴法師

SQS 10 — 確保使用者知道如何申請接受和退出服務

	服務質素標準內容
申請服務的資格	居住於港島或離島區濫用危害精神毒品的人士; 有濫用危害精神毒品危機人士; 濫用危害精神毒品或有濫用危害精神毒品危機人士 的親屬、朋友; 關心濫用危害精神毒品問題的教師、社工、社區人士 及其他相關專業人士。
申請輔導服務方法	來電; 親臨中心; 轉介 (由教師、社工、社區人士及其他相關專業人士); 為使服務使用者不會因為經濟原因而未能參加活動,社工可以因應服務使用者的經濟狀況減免活動收費。
申請抗毒教育服務方法	服務使用者可填寫「社區教育服務需要評估表」; 本中心職員對有關申請進行評估是否獲批准;
申請專業培訓活動方法	服務使用者填寫「專業培訓申請」表格; 服務使用者在最少一星期前確認合作,並填寫『專業培訓 確認信;
終止提供服務的準則與安排	本中心及服務使用者可以口頭或書面提出; 在可能的情況下,終止服務需於雙方口頭或書面提出, 並同意下進行。

東華三院越峰成長中心

中西南及離島服務處:	香港上環禧利街2號東寧大廈15樓
東區及灣仔服務處:	香港筲箕灣寶文街6號東華三院方樹泉社會服務大樓9樓
東涌服務分處:	大嶼山東涌逸東邨(二)美逸樓地下
戒毒輔導熱線:	2884 1234
電話:	2884 0282
傳真:	2884 3262
網址:	http://crosscentre.tungwahcsd.org/
電郵:	csdcross@tungwah.org.hk
督印人:	鍾燕婷
籌委:	陳潔華、張霆豐、林小鳳、陳敏婷、林源樺、林珮詩、袁卓音
印刷數量:	1,500
印刷日期:	2017年6月





